

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**Poziom 2****POWIADOMIENIE O WYSTĄPIENIU RYZYKA PRZEKROCZENIA
POZIOMU INFORMOWANIA DLA OZONU W POWIETRZU**

Informacja o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu	
Zagrożenie	Wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$) dla ozonu w powietrzu
Data wystąpienia ryzyka przekroczenia	05.08.2026 r. godz. 14.00
Prognozowany czas utrzymywania się ryzyka przekroczenia	Od godz. 14.00 do godz. 18.00 dnia 05.08.2026 r.
Obszar ryzyka przekroczenia	Obszar ryzyka przekroczenia poziomu informowania obejmuje: powiat miasto Gliwice, powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Chorzów, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Katowice, powiat miasto Mysłowice, powiat miasto Siemianowice Śląskie, powiat miasto Sosnowiec, powiat miasto Jaworzno, powiat miasto Tychy, powiat gliwicki, powiat tarnogórski, powiat bieruńsko-lędziński, powiat częstochowski, powiat myszkowski
Ludność narażona	Liczba mieszkańców obszaru, na którym występuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania: 2 105 474 osób.
Przyczyny wysokich stężeń	Emisja prekursorów ozonu oraz warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu w atmosferze, w tym wysoka temperatura, intensywne nasłonecznienie oraz niska prędkość wiatru.

Informacja o grupach ludności najbardziej narażonej na wysokie stężenia ozonu w powietrzu	
Wrażliwe grupy ludności	– osoby przewlekle chore na choroby układu oddechowego, – osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, – osoby z obniżoną odpornością i wrażliwe na upały.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia	Krótkookresowa ekspozycja na wysokie stężenia ozonu może powodować chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, szybki i płytki oddech oraz bóle głowy, zwłaszcza przy większym wysiłku fizycznym. Wysokie stężenia ozonu mogą powodować podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych, kaszel i napady duszności. Możliwe są podrażnienia i swędzenie oczu, bóle klatki piersiowej, podrażnienia śluzówki, a także choroby dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc)

Zalecane środki ostrożności w przypadku utrzymywania się wysokich stężeń ozonu w powietrzu	<u>Ogół ludności:</u> – unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, – ogranicz do minimum przebywanie na otwartej przestrzeni. <u>Wrażliwe grupy ludności:</u> – ogranicz do niezbędnego minimum przebywanie na otwartej przestrzeni (szczególnie w przypadku dzieci i osób chorych), – zapewnij opiekę oraz leki dla osób chorych i starszych. <u>Zaleca się również:</u> – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)
---	---

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń	
Zakres działań krótkoterminowych	-

Informacje organizacyjne	
Data wydania	05.08.2026 r. godz. 14.00
Podstawa prawna	– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845)
Źródła danych	– Państwowy Monitoring Środowiska dane z systemu pomiarów jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Publikacja	Portal „Jakość Powietrza” GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0